

Questa scheda di promemoria per il paziente contiene importanti informazioni di sicurezza che deve conoscere prima e durante il trattamento con acido zoledronico (5 mg soluzione per infusione).

Il medico le ha raccomandato il trattamento con acido zoledronico, che viene usato per trattare donne in post-menopausa e uomini adulti con osteoporosi oppure osteoporosi causata da terapia con steroidi e dalla malattia di Paget delle ossa negli adulti. Queste malattie comportano un assottigliamento ed indebolimento delle ossa, che quindi possono rompersi più facilmente.

Un effetto indesiderato chiamato osteonecrosi della mandibola/mascella (danno grave delle ossa della mandibola/mascella) è stato segnalato in pazienti in trattamento con acido zoledronico per l'osteoporosi. L'osteonecrosi della mandibola/mascella può verificarsi anche dopo l'interruzione del trattamento.

È importante cercare di prevenire lo sviluppo dell'osteonecrosi della mandibola/mascella, poiché è una condizione dolorosa che può essere difficile da trattare. Per ridurre il rischio di sviluppare l'osteonecrosi della mandibola/mascella, deve prendere alcune precauzioni:

Prima di iniziare il trattamento:

Informi il medico/infermiere (operatore sanitario) se ha qualsiasi problema alla bocca o ai denti. Il medico può chiederle di sottoporsi ad una visita dentistica se lei:

- è stato precedentemente trattato con un bifosfonato
- sta prendendo medicinali chiamati corticosteroidi (come prednisolone o dexametasone)
- è un/una fumatore/fumatrice
- ha il cancro
- non fa un controllo dal dentista da molto tempo
- ha problemi alla bocca o ai denti

Durante il trattamento:

- deve mantenere una buona igiene orale, lavarsi i denti regolarmente e fare controlli di routine. Se porta la dentiera, deve assicurarsi che questa aderisca in maniera adeguata.
- Se è in trattamento dal dentista o deve sottoporsi ad un intervento ai denti (ad es. all'estrazione di un dente), informi il medico e il dentista che è in trattamento con acido zoledronico.
- Contatti immediatamente il medico e il dentista se manifesta problemi alla bocca o ai denti come perdita di un dente, dolore o gonfiore, secrezione da piaghe o piaghe che non si rimarginano, poiché questi potrebbero essere segni di osteonecrosi della mandibola/mascella.

Legga il foglio illustrativo contenuto nel medicinale per ulteriori informazioni.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

